

CUANDO SE DEBEN EXTRAER DIENTES EN LA ORTODONCIA

Cuando se toma la decisión de realizarse un tratamiento de ortodoncia es necesario analizar con detenimiento el plan de tratamiento que se va a seguir para el feliz término de este, recuerde que para una mayor exactitud es necesario y obligatorio la toma de radiografías panorámica y cefálica lateral, modelos de estudio y fotos del paciente.



Panorámica



Modelos de estudio



Cefálica lateral

Una de las razones por las cuales las personas no se animan a la ortodoncia es la difícil realidad que existe en muchos casos de tener que prescindir de algunas piezas dentales.

La ortodoncia hoy en día se maneja de una forma muy diferente a décadas anteriores en las cuales se extraían dientes casi sin importar el diagnóstico del paciente, con el paso de los años y el uso de Brackets y alambres de última generación permiten hoy en día que esta práctica este cada vez más alejada de los tratamientos obteniendo grandes beneficios para el paciente en cuanto a la parte de duración y estética del tratamiento.

A CONTINUACIÓN LE ENUMERARÉ 4 CASOS TÍPICOS EN LOS QUE SE DEBEN REALIZAR EXTRACCIONES:

- * Cuando la falta de espacio para acomodar los dientes es severa, por ejemplo los caninos no tienen espacio para salir o existen más dientes en el arco superior que en el inferior (discrepancia esquelética-dental).
- * Cuando el perfil facial del paciente se quiere mejorar debido a unos labios salidos o aumentados.
- * Cuando existe incompatibilidad labial (el paciente no es capaz de cerrar su boca).
- * Muchos casos en los que se requiere de una intervención quirúrgica para corregir un desbalance esquelético.