

CUIDADO DE LOS PROVISIONALES

Si Usted está en un tratamiento de prótesis fija y tiene provisionales en su boca:

- Evite consumir alimento duros o pegajosos, pueden despegar el provisional.
- Evite los cambios de temperatura bruscos en su boca. Por ejemplo tomar un tinto hirviendo y pasarlo con agua helada. Estos cambios bruscos de temperatura deterioran el cemento y pueden despegarle el provisional.



- Cepílese como lo hace normalmente y luego pase la seda teniendo en cuenta que debe ser delicado en la zona donde tiene provisionales. Cuando la vaya a retirar, hágalo con suavidad.
- Use enhebradores para pasar la seda por debajo de las zonas donde se están reemplazando los dientes ausentes.
- El uso de cepillos interproximales puede ser útil para la higiene, consulte con su odontólogo si se adecuan a su caso.
- Es normal que tenga un poco de sensibilidad en la zona donde se tallaron los dientes, ésta debe pasar en pocos días, en caso de que persista consulte a su odontólogo.
- Si siente que algún provisional se afloja o se despegue, póngase cuanto antes en contacto con su odontólogo.
- Si los provisionales se le pierden, deben volverse a repetir y usted debe asumir el costo de ellos.

Recuerde que el cemento que se utiliza para unir estos dientes a la estructura dental es provisional y es normal que tenga una duración de 15 o 20 días, por eso si tiene programado un viaje hágalo saber a su odontólogo.